


**MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2010-2019**


El cáncer cervicouterino es considerado un problema a nivel mundial y sigue siendo importante entre los más frecuente en las mujeres. Se ha considerado que, debido al acceso limitado a los servicios de detección y tratamiento, la gran mayoría de las defunciones ocurre entre mujeres que viven en países de ingresos bajos y medianos, por lo que requiere efectuar un profundo análisis, conociendo que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama en el mundo, según la OPS/OMS.




Para Ecuador, en el año 2018 se presentó en mujeres 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 100.000 mujeres y 150 casos por cada 100.000 hombres; donde el cáncer de mama (18,2 %) y cérvix (10,6 %) ocupan los dos primeros lugares (Globocan 2018)

En Guayaquil, la presentación de una de las patologías frecuentes en mujeres es el cáncer de cérvix invasor, y con relación a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a estabilizarse en los últimos años observándose una tasa de 5,81 en el 2010; 5,20 en el 2013; 4,64 en 2016 y en el 2018 con 5,33 muertes por cada 100.000 mujeres.

Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con una tendencia creciente en los últimos años y de igual manera le sigue en importancia el grupo de 45-59 años entre los más importantes; el grupo de 30 – 44 años la tendencia se mantiene estable en forma anual; cabe indicar, que el grupo de 15 a 29 años son escasos y sin fallecimientos en el último año.




**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE CÉRVIX EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2010-2019**



La mortalidad en los países en desarrollo ha evolucionado, requiriendo un análisis cada período; y en referencia a la mortalidad del cáncer de Cérvix, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de

vida; utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se obtuvo, para el año 2010 la pérdida de 1,2 años; en 2013 de 1,1 año, en 2016 de 1 año, mientras que en el 2019 fue de 1,1 años por cada mil mujeres menores de 75 años; con una ligera tendencia a la disminución en esta década.

A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de Cérvix están falleciendo con un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 5.670 años durante esta década en ese grupo etario; además, se observa una presencia importante de AVPP en el



grupo etario de 30 a- 44 con una pérdida de 5.550 años; estando presente de manera sostenida aunque con poca pérdida de años en el grupo de 60 – 74 años y con presencia esporádica en el grupo de 15 – 29 años en algunos años de este período analizado.

Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística - SOLCA –Guayaquil / noviembre 2020 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Rina Quinto Briones

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Ginecología