

**MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2008-2017**


A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de estómago representa la segunda causa de muerte, tanto su incidencia como mortalidad han variado en este siglo. Existen, sin embargo, diferencias a nivel de cada país, así por ejemplo la mortalidad por cáncer de estómago en el sexo masculino en Corea del Sur es de 54,6 x 100 000 habitantes mientras que en los EE.UU. es 5,3 x 100 000. Países como Japón, Costa Rica y Chile son los países con más alta incidencia y





mortalidad de cáncer gástrico, revelando la influencia de factores ambientales, dietéticos y genéticos que prevalecen en cada país.

En Guayaquil, la mortalidad ha venido ligeramente disminuyendo en estos últimos años, teniendo en el 2008 de 6,40 muertes por 100.000 habitantes al 2017 de 5,42 muertes.


Mayormente fueron afectadas los hombres, con tendencia de manera general a disminuir en los últimos años.



Entre los grupos etarios en los hombres y mujeres fueron mayormente de 60 – 74 años, seguido de 45 – 59 años de edad, pero en los hombres viene incrementándose, mientras que en las mujeres tiende a sostenerse y con tendencia al decrecimiento. Sin embargo, es la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos.





TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN MENORES DE 75 AÑOS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2017



Actualmente, se requiere medir la mortalidad en nuestros países cada cierto período; y en cuanto a la mortalidad en el cáncer de estómago, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), midiendo el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; en que se usó la esperanza de

vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador, se obtuvo en Guayaquil para el año 2008, la pérdida de 1.19 años por cada mil habitantes, mientras que en el 2012 fue de 1.16 y en 2017 de 0,83; que expresa el decrecimiento del cáncer de estómago.



A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de estómago están falleciendo más tempranamente los hombres. Entre ambos sexos se tuvo un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 11.227 años durante esta década; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a 44 en el periodo estudiado con una pérdida de 7.575 años; los restante grupos de edad se mantienen de forma constante año a año. Los AVPP en hombres tuvieron una variación de incremento de muertes en el 2014 para luego estabilizarse y tener una tendencia a disminuir, en cuanto a las mujeres el comportamiento del indicador de AVPP es más estable en los diferentes grupos.