



MORTALIDAD POR CÁNCER DE HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS EN MENORES DE 75 AÑOS DE GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2022




El tumor maligno de hígado y de vías biliares intrahepáticas es un tipo de cáncer que se origina en ese órgano cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada; siendo el órgano más grande del cuerpo y que tiene funciones muy importantes en el organismo del ser humano.

El cáncer de hígado ocupa un lugar importante en la incidencia en Guayaquil y la mortalidad no ha sido la excepción, por lo que no debe ser desatendido, ya que se ha observado un aumento de forma sostenida la tasa de Mortalidad en ambos sexos en menores de 75 años de edad, obteniéndose en el año 2008 de 2,6; año 2012 con 3,7, en 2017 fue 3,5; y en el año 2022 de 3,1 muertes por 100.000 habitantes. Según el sexo, mayormente fueran afectadas las mujeres que va con una tasa en el 2008 de 2,6 al año 2022 de 3,8 muertes, mientras que en hombres en el año 2008 fue de 2,5 y al año 2022 de 2,5 muertes por 100.000 habitantes en menores de 75 años de edad en estos 15 años de estudio.



De acuerdo al sexo con respecto a los grupos etarios según su tasa de mortalidad, se observó poca diferencia en la afectación, los mismos fueron de 60 – 74 años de edad en ambos sexos, seguido de 45 – 59 años de edad. Siendo la tendencia al incremento en las mujeres mientras que en los hombres tiende a estabilizarse y disminuir en los últimos años en el grupo de mayor afectación, y es estable su comportamiento en los otros grupos de etarios.




Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC

Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo / Departamento de Bioestadística SOLCA -Guayaquil / noviembre 2023

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos


TASA DE AVPP POR CÁNCER DE HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS EN MENORES DE 75 AÑOS DE GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2022





El indicador epidemiológico de mortalidad de años de vida potencialmente perdidos, permite observar el impacto de la enfermedad, y de acuerdo al sexo y edad. En estos quince años analizados en Guayaquil, se ha observado un comportamiento fluctuante hacia el decrecimiento en menores de 75 años,

(edad que es el promedio de la esperanza de vida en el Ecuador). En el año 2008 la tasa de AVPP por 1000 habitantes fue de 0,4; en el año 2012 de 0,6; en 2017 fue 0,5; y en el año 2022 de 0,5 años de vida potencialmente perdidos en menores de 75 años por cada 1000 habitantes.

En la tasa de AVPP por sexo, se observó fluctuación en su comportamiento, pero tiene un comportamiento variado con tendencia al incremento en los últimos años en hombres como en mujeres de años de vida potencialmente perdidos por 1000 habitantes.



En los años de vida perdidos según el sexo y grupo de edad afectado, se observó tanto en hombres como mujeres que el grupo de 45-59 años es donde se encuentra el mayor peso de la mortalidad; sin embargo, se evidencia la presencia en los adultos jóvenes de 30-44 años y en edades menores a 30 años, que amerita efectuar un análisis detallado sobre los factores que influyen en estas muertes prematuras. Obteniéndose una pérdida de **7605 años** en el **grupo etario de 45-59 años**, y de **5790 años** del **grupo etario de 60-74 años** en ambos sexos en estos 15 años de estudio.



Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC
Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo / Departamento de Bioestadística SOLCA -Guayaquil / noviembre 2023
Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos