



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN MENORES DE 75 AÑOS EN GUAYAQUIL.  
PERÍODO 2008-2022**

El cáncer cervicouterino sigue siendo importante entre los más frecuente en las mujeres y es considerado un problema a nivel mundial. Debido al acceso limitado a los servicios de detección y tratamiento, la gran mayoría de las defunciones ocurre entre mujeres que viven en países de ingresos bajos y medianos, por lo que requiere efectuar un profundo análisis, conociendo que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama en el mundo, según la OPS/OMS. Para Ecuador, su incidencia en el año 2020 presentó el cáncer de cérvix 9,5 %, ocupando el segundo lugar. (Globocan 2020)

En Guayaquil, la presentación de una de las patologías frecuentes en mujeres es el cáncer de cérvix invasor, y con relación a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a estabilizarse en los últimos años, observándose una tasa de 6,0 en el año 2008; 5,2 en el 2012; 4,4 en el 2017; y en el 2021 con 5,8 muertes por cada 100.000 mujeres.



Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con una tendencia ligera al decrecimiento en los últimos años con algunas fluctuaciones en su comportamiento; de igual manera le sigue en importancia el grupo de 45-59 años entre los más importantes y su comportamiento es sostenido con ligero incremento; el grupo de 30 – 44 años la tendencia se mantiene estable en forma anual durante estos últimos 15 años; cabe indicar, que el grupo de 15 a 29 años son escasos pero existen fallecimientos en algunos años por esta causa.



Fuente: Registro de Tumores de SOLCA - Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC  
Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo - Departamento de Bioestadística SOLCA -Guayaquil /noviembre 2023  
Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Ginecología


**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE CÉRVIX EN MENORES DE 75 AÑOS GUAYAQUIL.  
PERÍODO 2008-2022**



La mortalidad en los países en desarrollo ha evolucionado, requiriendo un análisis cada período; y en referencia a la mortalidad del cáncer de Cérvix, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que

tienen las muertes prematuras para una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se obtuvo, para el año 2008 la pérdida de 1,4 años; año 2012 de 0,9 años; en 2017 de 0,9 años, mientras que en el 2022 fue de 1,3 años por cada mil mujeres menores de 75 años; con una tendencia a la sostenida en estos 15 años de estudio en lo referente a su comportamiento de los años de vida potencialmente perdidos.

A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de Cérvix están falleciendo con un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 9.675 años durante estos 15 años en ese grupo etario; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a- 44 con una pérdida de 8.40 años; estando presente de manera sostenida aunque con poca pérdida de años de 2.460 años en el grupo de 60 – 74 años y con presencia esporádica en el grupo de 15 – 29 años en algunos años de este período analizado de las que fallecieron por esta causa.



**Fuente:** Registro de Tumores de SOLCA - Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC  
**Elaboración:** Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo - Departamento de Bioestadística SOLCA -Guayaquil /noviembre 2023  
**Revisión:** Gerencia hospitalaria / Comité de Ginecología