



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN MENORES DE 75 AÑOS  
GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2022**





Entre las causas de muerte más importantes en estos 15 años de estudio, el cáncer de estómago representa uno de ellos. Sin embargo, existen diferencias entre ciudades y regiones de cada país.

Se ha observado que la mortalidad en la ciudad de Guayaquil, ha venido comportándose de manera sostenida en estos 15 años; obteniéndose en el año 2008 con 6,4 muertes; 2012 de 7,0 muertes, 2017 de 5,4 muertes, y el año 2022 de 7,1 muertes por 100.000 habitantes.




En cuanto a la tasa de mortalidad por sexo, los hombres fueron afectados mayormente en los años estudiados, pero con presentación de tendencia sostenida al incremento en las mujeres en los últimos años, obteniéndose en hombres en el año 2008 con 7,5 muertes, 2012 con 8,0 muertes, 2017 de 7,4 muertes y el año 2022 de 6,8 muertes por 100.000 habitantes. De igual forma pasa con las mujeres en el 2008 con 5,4 muertes, 2012 con 6,2 muertes, 2017 de 4,4 muertes, y el año 2022 de 7,4 muertes por 100.000 habitantes.

De acuerdo a la tasa de mortalidad según sexo y grupo etario, se observa en ambos sexos que el grupo de 60 – 74 años de edad, siendo ese grupo que tiene la mayor tasa con una tendencia sostenida en los últimos años. Seguido en menor proporción del grupo de 45 – 59 años tanto en hombres como en mujeres, y se han mantenido tasas de menor proporción en el grupo etario de 30 – 44 años. Cabe indicar, que ha existido la presencia esporádica en el grupo de 15 – 29 años de edad.



Fuente: Registro de Tumores de SOLCA-Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador- INEC  
Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo - Departamento de Bioestadística SOLCA –Guayaquil /noviembre 2023  
Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos

**TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN MENORES DE 75 AÑOS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2023**





Es importante medir la mortalidad en nuestros países y en sus regiones; tomando la mortalidad en el cáncer de Estómago, se revisa el indicador de Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años

(referencia para este indicador), del que se obtuvo en Guayaquil para el año 2006, la pérdida de 1,3 año por cada mil habitantes, mientras que en el 2010 fue de 1,1, en 2015 de 1,2 y en el año 2021 de 1,2; que expresa una sostenibilidad de indicador de tasa de AVPP del cáncer de estómago. Además, presenta en estos 15 años de estudio una tasa de AVPP mayor en hombres comparados con las mujeres.



A través del indicador AVPP según sexo y grupo de edad, se señala que, por el cáncer de Estómago están falleciendo más tempranamente los hombres. Entre ambos sexos se tuvo un mayor peso de años perdidos en el **grupo etario de 45 – 59 años**, donde se perdieron un total de **20.295 años** durante estos años de estudio; además, se observa una presencia importante de AVPP en el **grupo etario de 30 - 44** en el periodo estudiado con una pérdida de **14.438 años**, con tendencia al crecimiento en ambos sexos; los restantes grupos de edad mantienen año a año, pero existe una presencia importante en el grupo de 60 – 74 años. Los AVPP en hombres tuvo fluctuaciones de incremento de muertes para luego estabilizarse y ligeramente disminuir, en cuanto a las mujeres es más estable con tendencia al incremento en los diferentes grupos etarios.



Fuente: Registro de Tumores de SOLCA-Guayaquil / Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador- INEC  
Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo - Departamento de Bioestadística SOLCA-Guayaquil /noviembre 2023  
Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos